

L'HYPOGLYCEMIE A DOMICILE

PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE DE
L'HYPOGLYCEMIE A DOMICILE

1* Les objectifs glycémiques d'une personne diabétique est :

- En préprandial compris entre 0.80 et 1.20
- En postprandial compris entre 1.20 et 1.70

L'objectif est dans les deux cas à moduler en fonction du patient.

2* Le taux définissant une hypoglycémie est :

- En préprandial égal à 0.70
- En postprandial égal à 0.80

3* Face à un patient conscient présentant une hypoglycémie préprandiale, lui sera donné :

- Trois morceaux de sucre **OU**
- Un verre de jus de fruits **OU**
- Une compote sans sucre

Suivi directement du repas (priorité aux féculents)

Face à un patient conscient et sous insuline :

- Diminution de la dose d'insuline rapide de 2Ui
- Contrôle une demi-heure plus tard par le patient ou la famille (si possible)

4* Face à une hypoglycémie chez un patient inconscient :

- Injection de G30% en intraveineuse à renouveler jusqu'au réveil
- **Appel au 15**

**** L'injection de glucagon n'est indiquée que chez un patient sous insuline et après injection de G30% (inefficace sous sulfamide) ****

NB : vérifier la date de péremption et conserver au réfrigérateur.

5* Le matériel à avoir dans la trousse pour faire face aux hypoglycémies est :

- Plusieurs ampoules de G30%
- Le matériel à perfusion
- Un lecteur glycémique et des bandelettes